

## Aktiv naturpleje i foldene, hvad kan vi gøre?

Større udtynding af tjørn, bævreasp og store partier med tidsler tager kommunen sig af.

Vi kan supplere med lokal bekæmpelse af:

### Brændenælder

Slås, gerne med le. Kvierne spiser dem når de har ligget et stykke tid.

### Horsetidse



Førsteårs-



Andetårsplante

<http://www.danmarksflora.dk/0204.php>



Rodstikkes.

### Pastinak

Rodstikkes. Husk handsker og ingen bar hud. Saften fra planten giver udslæt.

<http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=259>



<http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4152>



<http://naturstyrelsen.dk/nyheder/2011/jul/giftig-plante-skader-huden/>

### Kruset skræppe

Slås, rodstikkes. <http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=79>



## Engbrandbæger



Der er begyndt at dukke engbrandbæger op. De er giftige for dyrene som heller ikke spiser dem. Men ser vi dem, så hiv dem op og smid dem til affaldsforbrænding, ikke på komposten.

<https://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3426>

<http://www.sagro.dk/nyhedsarkiv/giftig-engbrandbaeger-skal-bekaempes-nu>

## Fugletårnsfolden

### Padderok

I **Fugletårnsfolden** vokser der i området mellem det tørre land og vådområdet kærpadderok. Den er giftig, og kvierne spiser den ikke. Derfor breder den sig og bør slås, gerne med le. Den ligner agerpadderokken, men agerpadderokken vokser ikke nær så talrigt, og den skal ikke bekæmpes.

I vådområdet vokser dyndpadderok, den er talrig, men vi kan bare lade den være.

### Kærpadderok:

<https://da.wikipedia.org/wiki/K%C3%A6r-Padderok>

Kærpadderok ligner agerpadderok, men hos kærpadderok er bladskederne meget længere end det inderste led på sideskuddene. Desuden er sideskuddene ikke skarpt firkantede som hos agerpadderok, men derimod afrundet femkantede.

<http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=3713>



<http://allearter-databasen.dk/index.php?taksonomi=Equisetum+palustre>

### **Dyndpadderok**

<http://www.danmarksflora.dk/0302.php?planteid=2>

Dynd-Padderok vokser nær vand eller i vand. Aksene er sortbrune og 1-2 cm lange på grønne sommerskud, som kan være med eller uden grene. Bladkransene har spidse, sortrandede tænder. *Den meget store centralhule i stænglen er karakteristisk for arten.*

### **Hulkravet kodriver**

Vi kan evt. hjælpe hulkravet kodriver i Fugletårnsfolden (og Vestfolden) ved at slå omkring den.



## Vestfolden

Vådområdet i er ved at gro til, og vi kan supplere græsningen med høslæt, gerne med le. Det er vandpeberrod og rørgræs der breder sig.

### Vandpeberrod:



<http://www.fugleognatur.dk/artintro.asp?ID=3670>

### Rørgræs:

(vokser vist også i vestligste den af Nordfolden)



<http://www.fugleognatur.dk/artsbeskrivelse.asp?ArtsID=4104>